

## BAB V

### KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan Klinik Syafira 2 Cikampek dapat di simpulkan :

- A. Pola persebaran obat gastritis di Klinik Syafira 2 Cikampek menggunakan golongan obat Omeprazole (*PPI*), Antasida, Ranitidine (*H2 Blocker*) dan Sucralfat (*PMD*). Aturan pakai obat gastritis di Klinik Syafira 2 Cikampek semua obat untuk gastritis di minum sebelum makan dengan jumlah resep yang di dapat 70 dengan hasil presentasi 100%. Frekuensi pemberian obat gastritis di Klinik Syafira 2 dengan hasil Ranitidine sebanyak 32 resep dengan hasil persentase 100%. Pada jumlah resep obat gastritis dengan dosis pemberian obat menghasilkan kesesuaian di Klinik Syafira 2 Cikampek.
- B. Golongan obat yang paling banyak digunakan untuk terapi gastritis di Klinik Syafira 2 Cikampek adalah golongan obat antasida dengan jumlah 62 resep dan dengan hasil persentase 88%.
- C. Kombinasi obat gastritis yang paling banyak digunakan oleh Klinik Syafira 2 Cikampek yaitu Ranitidine + Antasida sebanyak 27 resep dan dengan hasil persentasinya sebanyak 38%.

