

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah :

1. Berdasarkan Gambaran Karakteristik Distribusi Umur Pasien paling banyak pada usia 20-34 tahun sebesar 69% dengan usia kandungan sebanyak 38-42 minggu sebesar 80%. diagnosis utama paling banyak dengan diagnosis pre-eklampsia berat sebesar 80%.
2. Berdasarkan Jumlah Obat anti hipertensi yang paling banyak digunakan adalah Nifedipine. Jenis Obat Lain Yang Digunakan Bersama Obat Antihipertensi yaitu MgSo<sub>4</sub> sebesar 80 % dan Menggunakan Cairan Infus RL Sebesar 100%.
3. Terdapat interaksi obat antara Nifedipine dengan 4 golongan obat yaitu NSAIDs sebesar 78%, H<sub>2</sub> receptor antagonis sebesar 8%, phenothiazine dan magnesium compounds. Terdapat interaksi obat antara Methyldopa dengan obat golongan iron compounds dan phenothiazine.

#### **5.2 Saran**

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut antara obat-obat supportif yang diberikan pada pasien pre-eklampsia.

