

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Potensi Interaksi obat pada Pasien DM tipe 2 dengan Komplikasi Hipertensi rawat jalan di RS Dewi Sri Periode Januari-Desember 2021 dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Golongan obat antidiabetes yang diberikan kepada pasien adalah sulfonilurea 51%, biguanid 9%, alfa glukosidase 8%, insulin 32%.
- b. Golongan obat antihipertensi yang diberikan kepada pasien adalah ARB 43%, CCB 36%, Diuretik thiazid 4%, diuretik 13%, ACEI 4%.
- c. Dari total 114 pasien yang memiliki diagnosis DM tipe 2 dengan komplikasi hipertensi hanya 19 pasien. Pasien yang memiliki kemungkinan terjadinya interaksi obat hanya 4 pasien dengan interaksi minor 1 dan moderat 3.

#### **5.2 Saran**

Adanya potensi interaksi obat pada resep menuntut farmasis untuk lebih teliti pada saat penyiapan obat, dan jika pada resep menemukan obat yang memiliki interaksi atau menemukan masalah pada resep tersebut hendaknya berkonsultasi dengan dokter. Farmasis juga harus memberikan informasi obat dengan baik dan benar, agar tercapainya target terapi.