

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Hasil penelitian bahwa karakteristik pengguna amlodipin sebanyak 35 orang (50%) dan pengguna candesartan 35 orang (50%) berdasarkan pencapaian target tekanan darah sebanyak 40 orang (57,10%) dan yang tidak mencapai tekanan darah sebanyak 30 orang (42,90%), berdasarkan jenis kelamin lebih banyak laki-laki 38 orang (54,30%) dari pada perempuan sebanyak 32 orang (45,70%) berdasarkan usia lebih banyak penderita stroke iskemik dengan faktor risiko hipertensi pada usia ≤ 60 tahun sebanyak 44 orang (62,90%) di banding usia ≥ 60 tahun sebanyak 26 orang (37,10%), berdasarkan tekanan darah sistol awal yang paling banyak pada rentang 160-179 mmHg sebanyak 26 orang (37,10%) dan berdasarkan tekanan darah diastol yang paling banyak pada rentang 90-99 mmHg sebanyak 21 orang (30,00%).
2. Hasil penelitian dari perbedaan penurunan target tekanan darah antara kelompok amlodipin dengan candesartan yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok obat tersebut karna memiliki nilai *p value* $\geq 0,05$.

5.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pengambilan data primer pasien untuk mengetahui faktor faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah, dan dilakukannya penelitian lebih lama sehingga dapat melihat efek terapi jangka panjang.