

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Hasil profil penggunaan kortikosteroid pada penyakit asma di Klinik Pupuk Kujang Cikampek di peroleh dari jenis kelamin tertinggi yaitu laki-laki sebanyak 53,28% dengan umur 0-5 tahun penggunaan obat yang paling banyak digunakan yaitu triamcinolon oral sebesar 40,19%.
2. Berdasarkan penggunaan obat asma yang rasional pada pasien di Klinik Pupuk Kujang Cikampek evaluasi berdasarkan tepat pasien bernilai 68,22 %, tepat indikasi 76,63 %, tepat obat 85,04%, dan tepat dosis 93,46 %. Penggunaan kortikosteroid masih rasional, namun masih perlu diterapkannya pemeriksaan asthma control test terhadap pasien asma sehingga penggunaan kortikosteroid pada penatalaksanaan asma sesuai dengan terapi yang direkomendasikan (GINA, 2016).

#### 5.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian tentang evaluasi rasionalitas penggunaan kortikosteroid secara lengkap dengan menggunakan metode prospektif sebagai pembanding agar lebih relevan.
2. Perlu dilakukannya perbaikan dalam penulisan informasi dan kejelasan dan kelengkapan dalam penulisan rekam medik, sehingga peneliti bisa dengan mudah membacanya.