BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terjadi pada lanjut usia (*elderly*) yakni sebanyak 20 pasien (66,3%), selebihnya pada usia tua (*old*) sebanyak 10 pasien (33,3%) dan tidak terdapat pasien dengan usia lebih dari 90 tahun.
2. Adapun pengaruh anti diabetes Tunggal terhadap efek samping obat dengan metode Chi-Square didapatkan hasil $0,001 < 0,005$ yang berarti dapat disimpulkan memiliki pengaruh yang signifikan antara anti diabetes Tunggal terhadap efek samping obat.
3. Pengaruh antidiabetes kombinasi terhadap efek samping obat dengan metode Chi-Square didapatkan hasil ($0,553 > 0,05$), maka diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kombinasi obat dengan efek samping obat / ADRs.
4. Berdasarkan algoritma Naranjo pasien diabetes melitus tipe 2 di rumah sakit umum proklamasi karawang yang mengalami kejadian efek samping obat berjumlah 30 pasien, dan didapatkan skor paling banyak adalah 9 (*highly probable*) berjumlah 17 pasien . Pasien diabetes tipe 2 yang tidak mengalami efek samping 0 pasien. Pasien dengan skor 6-8 (*probable*) mengalami efek samping dari penggunaan obat antidiabetes tersebut . Pasien dengan skor 9-11 (*highly probable*) mengalami efek samping dari penggunaan insulin.

5.2 Saran

Disarankan untuk peneliti lain agar memperbanyak sampel dan populasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta mencari jurnal jurnal yang relevan terkait penelitian yang diambil dan disarankan untuk mengembangkan diberbagai tempat penelitian di karawang.