

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai ACER Metformin + Glimepiride 1 mg dengan nilai 233,9. Adapun nilai ICER terapi antidiabetes oral Metformin + glimepirid 1 mg terhadap Metformin + glimepirid 3 mg dengan hasil Rp. 10.756 mg/dl, Metformin + glimepirid 2 mg terhadap Metformin + glimepirid 3 mg dengan hasil Rp. 104,78 mg/dl, dan Metformin + glimepirid 2 mg terhadap Metformin + glimepirid 4 mg dengan hasil Rp. 1.421 mg/dl,
2. Berdasarkan analisis biaya-efektivitas menunjukkan bahwa kombinasi Metformin + glimepirid 2 mg merupakan pilihan terapi yang memberikan keuntungan *cost saving* dibandingkan dengan dosis lainnya. Hal ini berdasarkan pada penurunan GDS ditunjukkan oleh nilai ICER yang paling rendah, yaitu Rp. 104,78 per mg/dl saat dibandingkan dengan kombinasi lainnya.

5.2 Saran

1. Bagi Peneliti
Untuk penelitian berikutnya dapat dilakukan analisis ekonomi secara prospektif dengan parameter klinis yang digunakan, HbA1C atau GDP dapat membedakan perbandingan efektivitas biaya yang lebih representatif.
2. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Karawang
Hasil penelitian analisis efektivitas biaya terapi antidiabetes oral kombinasi untuk pasien diabetes melitus rawat jalan dapat digunakan sebagai saran dan pertimbangan dimana kombinasi antidiabetes Metformin + Glimepiride 2 mg memiliki nilai yang lebih *cost-saving* dari pada antidiabetes lainnya.