

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, diambil beberapa kesimpulan:

1. Berdasarkan kuantitas dengan metode ATC/DDD didapatkan penggunaan antibiotik terbesar pada pasien rawat inap anak dengan tifoid adalah seftriakson sebesar 10,04 DDD 100 *bed-days*.
2. Berdasarkan kualitas, didapatkan penggunaan antibiotik terbesar pada pasien rawat inap anak dengan tifoid yang memenuhi kategori *Gyssens* penggunaan antibiotik tepat dengan kategori 0 adalah 55,68%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang telah didapatkan, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kuantitas dan kualitas penggunaan antibiotik pada pasien rawat inap anak dengan tifoid di rumah sakit X Kabupaten Karawang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hasil pengamatan pada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi kepada dokter dan dapat dijadikan sebagai bahan intervensi bagi farmasi di rumah sakit X Kabupaten Karawang, sehingga diharapkan penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat berkurang, sehingga tujuan pengobatan terapi yang tepat dapat tercapai.
2. Perlu adanya penelitian tindak lanjut dengan mengendalikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingginya nilai DDD.