

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 60 rekam medis pasien tuberkulosis paru di Puskesmas Lemah Abang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis kelamin, pasien yang paling banyak adalah yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 39 orang (65%) dari pada pasien perempuan 21 orang (35%). Berdasarkan umur pasien yang paling banyak yaitu umur 56-65 tahun 18 orang (30%). Berdasarkan pekerjaan yang paling banyak menderita penyakit paru yaitu pada pasien yang bekerja sebanyak 43 orang (70%) Berdasarkan tingkat pendidikan pasien paling banyak yaitu pada tingkat sekolah menengah atas sebanyak 30 orang (50%).
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa jenis efek samping OAT yang paling banyak dialami penderita TB selama menjalani pengobatan tahap intensif adalah mual sebanyak 21 orang (35%) dan diikuti efek samping lain berupa kurang nafsu makan, ngantuk, pusing, gatal, warna kemerahan pada urin, dan nyeri sendi.

5.2 Saran

Disarankan perlu dilakukan monitoring rutin efek samping OAT oleh petugas kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi efek samping OAT. Begitupun penelitian intervensi perlu dilakukan untuk meminimalkan efek samping OAT yang dialami penderita dalam rangka meningkatkan kepatuhan berobat dan mencegah penderita TB Paru putus berobat.